

Douce noire de Savoie

Vass4R12s311-315



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier


157Mtp18

Douce noire de  
Savoie  
(= Corbeau)


4 R 12 s 311-315

Douce noire de Savoie  
Corbeau  
4 R 12 s 311-315.











N° d'ordre :

Désignation : Douce noire de Savoie = Grignan.

Emplacement : 4 R 12 2344-345.

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -

cotonneux (190) - sans villosité pubescente (278) - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc (191) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (194) -

jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -

aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses (204) - sans villosité  
pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches (205) - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -

à liséré carminé 208 - jaune (209) - à plages bronzées ou cuivrées (210) -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -

duveteux (218) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (282) -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -

duveteux (224) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente (284) -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -

jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux (237) -

duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

JMB  
97



N° d'ordre :

Désignation : Douce noire de Savoie = Carbeau

Emplacement : 4 R 12 b. 3 11. 3 15.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre (242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente (288) - sans villosité laineuse (289).  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (249) - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert (253).

Noeuds : dos coloré 254 - à raies (255) - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert (259).

Vrille : verte 260 - jaune (261) - rouge clair (262) - rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert (265).

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

JCB  
97



Formulaire de description 4/8  
(entre nouaison et véraison)

Année : 1998

Observateur : Lacombe

Code cépage : 0157

Code clone : 18

Nom cépage : Douce noire de Savoie (= Corbeau)

Emplacement : 4 Ries 34-35

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 **pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe** : nulle 1 - point pétiole rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 **pigm. antho. nerv. face inf. limbe** : nulle 1 - point pétiole rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 **gaufre limbe** (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9.

oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I et II) : absente 1 - présente 9.

oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 **cloque face supérieure limbe** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087\* **densité poils dressés face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal :

**Densité poils couchés limbe face supérieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Densité poils dressés limbe face supérieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Couleur du pétiole** : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.



Formulaire de description 5/8  
(maturité)

Année : 1998

Observateur : Lacombe

Code cépage : 0157

Code clone : 18

Nom cépage : Douce noire de Savoie (-Corbeau)

Emplacement : 4 Ri 2 s 3 u - 315

Grappe

oiv 202 **longueur** : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) <sup>14</sup>3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 **largeur** : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) <sup>7</sup>3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte <sup>9</sup>9.

oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) <sup>3</sup>3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement <sup>1</sup>1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208\* **forme** : cylindrique <sup>1</sup>1 - conique ou pyramidale 2.

oiv 209\* **présence d'un aileron** : absent <sup>1</sup>1 - une aile <sup>2</sup>2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) <sup>15</sup>5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) <sup>15</sup>5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme <sup>3</sup>3.

oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie <sup>2</sup>2 - elliptique <sup>3</sup>3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir <sup>6</sup>6.

oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme <sup>2</sup>2.

oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte <sup>7</sup>7 - très forte 9.

oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince <sup>3</sup>3 - moyenne <sup>5</sup>5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 **ombilic** : peu apparent <sup>1</sup>1 - apparent 2.

oiv 230\* **coloration de la pulpe** : non colorée <sup>1</sup>1 - colorée 2.

oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée <sup>1</sup>1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse <sup>2</sup>2.

oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible <sup>1</sup>1 - faible <sup>3</sup>3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 **saveur** : aucune <sup>1</sup>1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236\* **saveur** : aucune <sup>1</sup>1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) <sup>1</sup>1 - court (4-8mm) <sup>3</sup>3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile <sup>3</sup>3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents <sup>3</sup>3.

oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. <sup>6-7 mm</sup>

oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes <sup>1</sup>1 - présentes 2.

Vassal : grappe : axe de la rafle : non coloré <sup>81</sup>81 - coloré 80.



**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année : 1999

Observateur :

Code cépage : 0157

Code clone : 18

Nom cépage : Douce noire de Savoie (= Corbeau)

Emplacement : 4 R 12 1311-315

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

vigueur 2

prunier 3